בוגירון

Bogiron 250 EC

بوچيرون

תרכיז מתחלב

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 04 / הצ / 1794

קוטל פטריות סיסטמי להדברת חלפת ומחלות נוספות בגידולים שונים

אריזה: 1, 5 ליטר

מכיל: 250 גרם difenoconazole בליטר

קבוצה: G1

כללי: בוגירון הוא קוטל פטריות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בגידולי שדה, מטע, ירקות ופרחים.

טבלת הוראות שימוש

הגידול	המחלה	המינון (ב%) / ריכוז (סמ"ק לדונם)		מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	הערות
		ריסוס לנגירה (מעל 100 ל'/ד')	ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל'/ד')		
כותנה	חלפת		50	30	
גזר	חלפת		75	7	בוגירון ינתן בכל טיפול שני לסרוגין עם תכשירים מקבוצה אחרת. בנגיעות נמוכה ומאוחרת רסס פעם בשבוע. בנגיעות קשה ומוקדמת צופף את הטיפולים עד כדי פעמיים בשבוע. הריסוס - לאחר ההשקייה.
תפוח-אדמה	חלפת		50-75	14	המינון הגבוה לריסוס בזנים רגישים למחלה, כמו: אלפא, ניקולה, אגריה, רוזוול, ראסט-בורבנק וקוסמוס.
שום	סטמפיליום		75	30	הריסוס נגד סטמפיליום יפחית גם את הנגיעות במחלת החילדון.
בצל, עירית, בצל ירוק	סטמפיליום		75	30	בשילוב עם קוטלי תריפסים למניעת "הלבנת קש".
חימצה	אסקוכיטה		30-50	7	בזנים רגישים ובתנאים טובים להתפתחות המחלה יש לרסס במינון 50 סמ"ק / ד'.
עגבניה	עובש עלים קמחונית	0.1% (100 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	100	7	רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות.
	חלפת	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50	7	
אבטיח לגרעינים	חלפת		75	14	

בוגירון

Bogiron 250 EC

بوچيرون

תרכיז מתחלב

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הגידול	המחלה	המינון (ב%) / ריכוז (סמ"ק לדונם)		מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	הערות
		ריסוס לנגירה (מעל 100 ל'/ד')	ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל'/ד')		
גיפסנית	קמחון		50		מומלץ לרסס מדי שבוע. הריסוסים יפחיתו חלפת (Alternaria Alternata) בפרחים פתוחים. אין לרסס בחודשים דצמבר-פברואר.
ציפורן	חלפת		75-100		בזנים: סטפני, טוני אדום, רויאלט, אוולין, סמארטי, קרינה, ליאור וברברה. המינון הנמוך מיועד לטיפולי מניעה, ובעצמות מחלה נמוכות.
פרח השעווה	חלפת קמחונית	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	50		דאג לכיסוי מיטבי של כל הענפים, ובייחוד הפנימיים.
זית	עין הטווס	0.06% (60 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		90	נותנים 2-3 ריסוסים בחודשים נובמבר, דצמבר ופברואר. הטיפולים ייעשו לאחר המסיק.
שסק	גרב	0.01% (10 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		14	
תפוח	גרב, קמחון בזן ענה	0.01%-0.02% (10-20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		14	רסס מדי 7-14 יום לפי עוצמת הנגיעות. המינון הגבוה - לקמחון.
	רקבון בית הגרעינים	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		14	יש לשלב עם מרפאן 500 בריכוז 0.25% . יש לתת 2-3 ריסוסים בזמן הפריחה. הראשון - בתחילת פריחה, ואח"כ - כל 6 ימים, בהתאם להתקדמות הפריחה.
גפן	קמחון	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		45	רסס בהגיע השריגים לאורך 10-20 ס"מ. בזן קריניאן (ובזנים רגישים אחרים) מקדימים לטפל בהגיע השריגים ל-10 ס"מ.
אפרסק נקטרינה	קמחון	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		20	בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קמחון בפרי. בחודשים יוני-אוגוסט רסס להדברת קמחון בעלווה. הריסוס יפחית גם את הנגיעות בחלדון.
אפרסמון	חלפת	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		45	יש לרסס לפני הגשמים.

בוגירון

Bogiron 250 EC

بوچيرون

תרכיז מתחלב

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס' 04 / הצ / 1794

המשך מעמוד קודם:

טבלת הוראות שימוש

הגידול	המחלה	המינון (ב%) / ריכוז (סמ"ק לדונם)		מועד אחרון לטיפול (ימים לפני קטיף)	הערות
		ריסוס לנגירה (מעל 100 ל'/ד')	ריסוס בנפח נמוך (עד 100 ל'/ד')		
ברוקולי	חלפת		75	21	רסס מדי שבוע
סלק	צרקוספורה		50	21	רסס מדי שבוע
תבלינים: כוסברה, שמיר, אורגנו, מנטה, רוזמרין, פטרוזיליה, קורנית, בזיל, טרגון, רוקולה	צרקוספורה חלפת		50	14	רסס מדי שבוע
סלרי עלים				20	
מרווה	קמחון		50	14	

שילובים:

- בכותנה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם אפלורד ת"ר, טלסטאר ת"מ, מוליט ת"ר, מץ' ת"מ, ואטברון ת"מ.
- בגזר ניתן לשלבו עם וורטימק ת"מ ומוליט ת"ר.
- בגפן ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם דורסן, דוראון ת"מ, סימבוש ת"מ, טיטאן ת"מ.
- בעגבניה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם ורטימק ת"מ, טריגרד א"ר, מץ ת"מ ועם מוליט ת"ר.
- בפרחים ניתן לשלב בוגירון עם מוליט ת"ר.
- בחימצה ניתן לשלב בוגירון ת"מ עם דואל גולד ת"מ ועם גאלאנט סופר ת"מ.
- בשאר הגידולים יש לבדוק כל שילוב על קטע קטן לפני ריסוס כל השטח.