

פרוטון

Protone 20 SG
پروتون

גרורים מסיסים



רשיון האגף להגנת הצומח מס': 4045/הצ/10

מוסת צמיחה לגפן

אריזה: 1 ק"ג

מכיל: s-aba 20% (חומצה אבזיסית)

כללי: פרוטון מבוסס על הורמון הצמיחה הטבעי - S-ABA, לשיפור והגברת הופעת הצבע האדום בענבים.

טבלת הוראות שימוש

משטח	נפח התרסיס	גרם תכשיר ל 100 ליטר מים/ לדונם	ריכוז בחלקי מליון	מועד הריסוס	מטרה	הגידול
בשילוב טריטון X-100 בריכוז 0.025%	100 ליטר לדונם, כדי הרטבה מלאה של כל הגרורים, אך מבלי להגיע לנגר מהגרורים, אם בנפח הנ"ל יש נגר אזי יש לרסס בנפח תרסיס נמוך יותר, אך חשוב להשאיר בטווח מינונים של 120-80 גרם לדונם כאשר מרססים עם אתרל, או כ- 200 גרם לדונם בריסוס ללא אתרל.	200	400	שבוע לאחר תחילת שינוי צבע האשכול (בוחל - כאשר ברוב האשכולות (80%-90%) יש גרורים רכים, או בריקס 10-12 אחוז)	הגברת צבע אדום בגרגר	ענבים
		100 (+40) (אתרל)	200 בשילוב עם אתרל בריכוז 0.04%			בזן קרימסון סידלס
		200	400	בשינוי צבע הגרורים (בוחל)	בזן פליים סידלס	

הערות:

- יש לרסס בכלי משקי בלבד ולא בריסוס ידני, או רובים.
- תוצאות מיטביות יתקבלו בריסוס עם מרסס מפוח בעל פומיות המייצרות טיפות קטנות.
- רצוי לרסס עם מפוח בעוצמת רוח חזקה ובמהירות של כ- 3 קמ"ש, שתבטיח כיסוי אחיד של כל הגרורים באשכול, אך להמנע מהגעה לנגר מהגרורים.
- יש לרסס בשעות בהן הטמפרטורות נמוכות והלחות-היחסית גבוהה (ערב/לילה/לפנות-בוקר), בכדי לאפשר יבוש איטי של התרסיס.
- אין לרסס אם יש תחזית לשרב (יובש וטמפרטורה מעל 35 מ"צ) ביומיים שלושה שאחרי הריסוס.
- בחלקות בהן יש היסטוריה של קושי רב לקבל צבע אדום בריסוס בודד יש לשקול לבצע ריסוס שני שבוע לאחר הריסוס הראשון.