

אמצעי מיגון נחוצים:

- בזמן הריסוס והטיפול בחומר חבוש כפפות ניטרל
- עמידות לכימיקלים בתקן (EN-374/3).
- הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד בתקן (EN-166)
- לבש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וכובע לכיסוי הראש.
- נעלי נעליים גבוהות סגורות.
- יש לחבוש מסכה חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן ABEK-P3 (תקן EN-14387)

- יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
- יש להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיקר בעיניים.
- הימנע מאכילה, שתייה או עישון בזמן הריסוס.

אזהרות סביבתיות:

- רעיל לכל החי במים (דגים, דפניה וכו').
- אין לרססו בקרבת מקווי מים או נחלים.
- עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים
- אינו רעיל לדבורים

הוראות שימוש:

הגידול	מטרה	מועד הטיפול	ריכוז (%) (סמ"ק תכשיר ל-100 ל מים)	נפח תריסוס	הערות
אגס מזון פופולונה	הגדלת פרי ושיפור חנתה	1. בפריחה אחידה: טיפול יחיד כאשר 90% מהפרחים פתוחים.	0.12% (סמ"ק תכשיר ל-100 ל מים)	100-120 ליטר לדונם בהתאם לגודל העצים.	חופעות של עלפון עלים קל הינה תופעה נורמלית אשר נעלמת לאחר מספר ימים מועט, ללא השפעות שליליות על היבול או על העץ
			0.06%-0.1% (סמ"ק תכשיר ל-100 ל מים)		

הכנת התריסוס:

מערבבים את הכמות הדרושה של התכשיר עם מעט מים ובוחשים היטב. את התערובת המתקבלת שופכים למיכל המרסס הממולא בחלקו במים. לאחר מכן מוסיפים את יתרת המים החסרה תוך ערבול מתמיד.

שילובים: יש לשלב עם טריטון Z-100 0.025%

בולרו תו בולירו BOLERO® SL17

תרכיז נוזלי

Soluble Liquid

מוסת צמיחה בתוארית נוזלית להגדלת פרי באגס

מכיל: 7 גרם Gibberellic acid
 בליטר. 5 גרם NAA
 5 גרם 2, 4-D (isopropyl ester)

מספר רישיון השירותים להגנה צ' / 04 / הצ' / 1775

מס' או"ם: 1219

דרגת הרעילות: מסוכן (IV)

עצור!

שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

לא לשימוש ביתי- לשימוש חקלאי!

ليس للاستعمال المنزلي = للإستعمال الزراعي

מסוכן לנשים בגיל הפוריות



הסוד של החקלאים

ת.ד. 160 ראש פינה 12000

טל. 04-6800070

פקס. 04-6930943

תכולה: 1 ליטר.

לתשומת לב: המשתמש נושא בסיכון לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מגורמים שמעבר לשליטתו של היצרן. היצרן לא ישא באחריות לכל נזק שעלול להיגרם מאחסון או שימוש בלתי נכון ושלא בהתאם להוראות המפורטות בתווית של התכשיר.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס:

בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיים.

הגנה אישית בגמר העבודה:

- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- שמו את האריזה סגורה היטב.
- הרחק ממזון, שתיה ומזון בע"ח.
- הרחק ממקור הצתה - העישון אסור.
- בגמר הריסוס יש להתרחץ במים ובסבון ולהחליף בגדי עבודה.
- יש לכבס בפרד בגדי עבודה עם סבון/דטרגנט, אל תלבש מחדש בגדים שלא מובסו.

מועד כניסה מחדש:

אין להיכנס לשטח המרסס לפני התייבשות התריסוס.

אחסון:

אחסן את חומר באריזתו המקורית במקום נעול, קריר שאינו עולה מעל 40 מעלות צלזיוס, מאורר ויבש, המאשר לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממוזנות האדם והחיה. הרחק ממקור חום ושמש ישירה.

שמו את האריזה סגורה היטב.

טיפול בתכשיר שנשפך:

תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפך חוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחיובי בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

סילוק תשטיים:

אין לרוקן ולשטוף תשטיים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכיל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריזות ריקות:

יש לשטוף את המיכל היטב שלוש פעמים לשפוך את התשטיים למיכל המרסס, לנזק את האריזה ולהשליכה לאשפה.

עזרה ראשונה:

- הרחק את הנפגע ממקור היתוהם.
- במקרה של תזוזת החומר הורד בגדים מזהמים.
- רחץ היטב את הגוף ונעור במים וסבון.
- במקרה של מגע החומר בעיניים שטוף אותן היטב עם מים במשך 45 דקות.
- במקרה של מגע החומר בעור שטוף אותן היטב עם מים וסבון.
- במקרה של סימני הרעלה פנה לקבלת עזרה רפואית.
- לידיעת הרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות ב"ח רמב"ם הוא: 04-7771900**